

Wickson

Tamaño: Grande a muy grande.

Forma: Redondeada o acorazonada. Generalmente algo asimétrica, con un lado algo más desarrollado.

Zona pistilar: Redondeada o bien más o menos apuntada. **Punto pistilar:** Pequeño, amarillo parduzco, aureolado de amarillo vivo. Superficial o ligeramente prominente. Situado en una depresión muy ligera o sobre una prominencia o a su costado, generalmente desviado hacia el dorso.

Sutura: Bien perceptible, línea verdosa, amarillenta o sonrosada, según la coloración general del fruto, destacándose por ser bastante más clara. Situada en depresión ligera o casi superficial, excepto en zona peduncular, donde forma un surco muy marcado.

Cavidad del pedúnculo: Anchura media, estrechándose bruscamente en forma de embudo. Muy profunda. Bastante rebajada en la sutura y casi imperceptible en el lado opuesto.

Piel: Muy fuerte, recubierta de pruina blanquecina muy fina, poco abundante. Sin pubescencia. **Color:** Amarillo verdoso o dorado que se va volviendo sonrosado, o anaranjado, pasando a carmín claro y llegando a rojo vivo en maduración completa. La coloración general no suele ser uniforme, excepto en el último caso. Punteado muy abundante, muy menudo. Color amarillento o cobrizo indefinido, aureolados, color de la aureola variable, siempre más intenso que la coloración general de la zona donde se encuentra y casi siempre muy visible.

Carne: Amarillo calabaza claro. Blanda, muy jugosa, algo fibrosa. **Sabor:** Muy aromático, refrescante, agri dulce. Bueno.

Hueso: Muy adherente. Tamaño medio. Alargado, puntiagudo. Surcos laterales en general bien marcados, el dorsal estrecho y discontinuo, con pequeños orificios. Caras laterales de superficie semilisa.

Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

